
Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op nier- en nierbekkenkanker
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine A	2	4,597	1,909	*1.23 (0.53-2.84)*
B-VITAMINEN				
Vitamine B1	2	4,597	1,909	*1.07 (0.51-2.23)*
MINERALEN EN SPORENELEMENTEN				
Calcium	3	494,621	1,367	*1.06 (0.90-1.24)*
Koper	2	95,958	353	*2.44 (0.43-13.84)*
METABOLIETEN EN AMINOZUREN				
Eiwitinname via de voeding	2	776,349	2,168	*1.30 (0.76-2.24)*
OVERIG				
Inname van met suiker gezoete dranken	4	599,592	1,649	*1.13 (0.98-1.30)*
Inname van bewerkt vlees	6	1,766,660	5,212	*1.15 (0.94-1.41)*
Inname van ultrabewerkte voedingsmiddelen	3	1,127,884	4,245	*1.18 (1.08-1.30)*
Inname van niet-voedende zoetstoffen	2	115,981	473	*1.28 (1.00-1.63)*
Rood vlees	6	1,768,446	5,800	*1.43 (1.13-1.82)*
Zuivel	6	512,230	2,409	*1.57 (1.10-2.25)*



RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op nier- en nierbekkenkanker. |◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) |◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) |◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn onder BI = 95%-voorspellingsinterval (indien beschikbaar) | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen

Include subexposures: No