
# 与前列腺癌（排除仅侵袭性癌证据）风险呈正相关的营养因子膳食摄入研究的荟萃分析

| 营养因子 | 研究数 | 样本量 | 病例数 | 合并 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| 维生素 A、C、D、E、K | | | | |
| 维生素 A | 5 | 3,207 | 1,358 | 1.12 (0.63-1.99) |
| 维生素 D | 3 | 247,791 | 29,373 | 1.34 (0.90-2.01) |
| B 族维生素 | | | | |
| 维生素 B12 | 2 | 719 | 245 | 1.47 (1.02-2.12) |
| 抗氧化剂 | | | | |
| 抗氧化剂 | 2 | 50,507 | 7,155 | 1.08 (0.76-1.54) |
| 矿物质与微量元素 | | | | |
| 铁 | 4 | 183,783 | 11,462 | 1.02 (0.94-1.10) |
| 硒 | 10 | 235,441 | 18,652 | 1.02 (0.93-1.12) |
| 锌 | 8 | 47,636 | 6,169 | 1.12 (0.86-1.45) |
| 钙 | 16 | 673,101 | 45,112 | 1.17 (1.07-1.27) |
| 发酵食品与益生菌 | | | | |
| 酸奶 | 3 | 201,324 | 7,680 | 1.25 (1.00-1.56) |
| 发酵食品 | 3 | 3,460 | 339 | 1.37 (0.76-2.45) |
| 脂肪酸与脂质 | | | | |
| α-亚麻酸 | 3 | 172,482 | 9,151 | 1.13 (0.89-1.44) |
| 单不饱和脂肪（MUFA） | 3 | 52,677 | 5,049 | 1.31 (1.00-1.73) |
| 多不饱和脂肪（PUFA） | 3 | 62,799 | 5,710 | 1.60 (0.97-2.64) |
| 饮食模式 | | | | |
| 西方膳食模式 | 2 | 44,462 | 1,702 | 1.35 (1.00-1.82) |
| 其他 | | | | |
| 复合维生素 | 2 | 5,473 | 2,403 | 1.02 (0.84-1.25) |
| 超加工食品摄入量 | 6 | 248,736 | 13,760 | 1.02 (0.95-1.10) |
| 加工肉类摄入量 | 8 | 1,089,615 | 64,702 | 1.09 (1.02-1.17) |
| 全谷物摄入量 | 3 | 79,458 | 7,209 | 1.11 (0.97-1.26) |
| 酒精 | 27 | 1,911,711 | 47,035 | 1.20 (1.10-1.31) |
| 乳制品 | 23 | 688,143 | 33,749 | 1.22 (1.11-1.34) |
| 红肉 | 10 | 873,126 | 56,254 | 1.60 (1.15-2.23) |




营养因子类别

维生素 A、C、D、E、K　抗氧化剂　发酵食品与益生菌　饮食模式　其他

B 族维生素　矿物质与微量元素　脂肪酸与脂质

RR > 1 = 与前列腺癌（排除仅侵袭性癌证据）风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No