
與腎細胞癌風險呈正相關的營養因子
膳食攝取研究的統合分析

營養因子	估計值數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
茄紅素	3	873,444	2,860	1.02 (0.73–1.42)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 A	2	4,597	1,909	1.23 (0.53–2.87)
B 群維生素				
葉酸	2	4,597	1,909	1.18 (0.60–2.32)
代謝物與胺基酸				
膳食蛋白質攝取量	2	776,349	2,168	1.30 (0.75–2.25)
其他				
加工肉類攝取量	6	1,766,660	5,212	1.15 (0.94–1.41)
超加工食品攝取量	2	647,537	594	1.38 (1.02–1.85)
紅肉	6	1,768,446	5,800	1.43 (1.13–1.81)
乳製品	3	3,506	1,009	2.72 (1.22–6.05)



RR > 1 = 與腎細胞癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時） | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No