
# 與前列腺癌風險呈負相關的營養因子
# 膳食攝取研究的統合分析

| 營養因子 | 研究數 | 樣本數 | 病例數 | 合併 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| 類胡蘿蔔素 | | | | |
| 葉黃素 | 2 | 1,623 | 677 | 0.65 (0.49–0.86) |
| β–胡蘿蔔素 | 10 | 94,949 | – | 0.79 (0.63–0.98) |
| 茄紅素 | 13 | 282,888 | 22,602 | 0.88 (0.79–0.98) |
| 維生素 A、C、D、E、K | | | | |
| 維生素 C | 10 | 68,446 | 7,637 | 0.86 (0.73–1.01) |
| 維生素 E | 13 | 270,107 | 13,301 | 0.95 (0.86–1.06) |
| B 群維生素 | | | | |
| 葉酸 | 5 | 131,386 | – | 0.89 (0.72–1.09) |
| 維生素 B6 | 3 | 70,879 | 7,656 | 0.89 (0.83–0.96) |
| 多酚與類黃酮 | | | | |
| 綠茶 | 7 | 99,090 | 1,577 | 0.62 (0.43–0.89) |
| 茶 | 10 | 314,398 | 15,389 | 0.75 (0.64–0.89) |
| 水果與蔬菜 | | | | |
| 大蒜 | 3 | 36,604 | 2,168 | 0.69 (0.42–1.13) |
| 番茄 | 11 | 1,057,923 | 67,108 | 0.74 (0.64–0.85) |
| 豆類 | 8 | 1,155,076 | 79,072 | 0.89 (0.81–0.97) |
| 脂肪酸與脂質 | | | | |
| 二十碳五烯酸 | 2 | 430,507 | 7,761 | 0.95 (0.79–1.15) |
| 植物雌激素 | | | | |
| 黃豆 | 8 | 85,059 | 5,399 | 0.60 (0.41–0.89) |
| 染料木黃酮 | 3 | 70,911 | 727 | 0.78 (0.37–1.63) |
| 草本與植物製品 | | | | |
| 銀杏 | 2 | 38,308 | 1,665 | 0.93 (0.68–1.27) |
| 代謝物與胺基酸 | | | | |
| 膳食蛋白質攝取量 | 2 | 109,557 | 3,064 | 0.99 (0.89–1.11) |
| 飲食模式 | | | | |
| 植物性飲食 | 2 | 211,318 | 24,516 | 0.91 (0.84–0.99) |
| DASH飲食 | 2 | 152,714 | – | 0.93 (0.82–1.06) |
| 其他 | | | | |
| 非水溶性膳食纖維攝取量 | 3 | 101,084 | – | 0.62 (0.38–1.03) |
| 水溶性膳食纖維攝取量 | 3 | 80,888 | 10,851 | 0.89 (0.83–0.96) |
| 總膳食纖維攝取量 | 7 | 972,077 | 64,899 | 0.92 (0.86–1.00) |
| 雞蛋 | 3 | 900,752 | 53,381 | 0.99 (0.96–1.02) |




RR < 1 = 與前列腺癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時）

Include subexposures: No