
공격성 전립선암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인

노출 요인	연구 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
라이코펜	2	166,781	-	0.58 (0.39–0.87)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 E	4	114,280	-	0.64 (0.40–1.04)
비타민 D	7	45,247	-	0.74 (0.51–1.08)
무기질 및 미량 원소				
셀레늄	5	123,475	-	0.65 (0.37–1.12)
아연	2	82,482	-	0.84 (0.17–4.29)
과일 및 채소				
토마토	2	76,726	-	0.73 (0.56–0.96)
기타				
총 식이섬유 섭취	2	885,584	5,076	0.86 (0.63–1.17)



RR < 1 = 공격성 전립선암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우) | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Latest publication per cohort

Include subexposures: Yes

발표된 아형 기저 위험 없음: HR ≈ RR ≈ OR 근사. 누락된 증례 수는 추정하지 않습니다.