
与前列腺癌风险呈正相关的营养因子膳食摄入研究的荟萃分析

营养因子	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 A	5	3,207	1,358	1.12 (0.63-1.99)
维生素 D	3	247,791	29,373	1.34 (0.90-2.01)
B 族维生素				
维生素 B12	2	719	245	1.47 (1.02-2.12)
抗氧化剂				
抗氧化剂	2	50,507	7,155	1.08 (0.76-1.54)
矿物质与微量元素				
硒	9	199,908	18,220	1.01 (0.91-1.13)
铁	4	183,783	11,462	1.02 (0.94-1.10)
钙	17	674,758	-	1.18 (1.08-1.29)
锌	9	94,876	7,312	1.18 (0.92-1.51)
矿物质补充剂	2	57,251	1,958	1.33 (0.79-2.26)
发酵食品与益生菌				
酸奶	3	201,324	7,680	1.25 (1.00-1.56)
发酵食品	3	3,460	339	1.37 (0.76-2.45)
脂肪酸与脂质				
Omega-9 脂肪酸	2	200,518	7,678	1.08 (0.84-1.40)
Omega-3 脂肪酸	7	577,598	18,792	1.09 (0.96-1.23)
多不饱和脂肪（PUFA）	12	644,179	-	1.25 (1.10-1.43)
单不饱和脂肪（MUFA）	7	255,429	-	1.27 (1.08-1.48)
α-亚麻酸	6	556,471	12,655	1.32 (1.08-1.62)
饮食模式				
地中海饮食	2	106,146	7,476	1.00 (0.90-1.11)
西方膳食模式	2	44,462	1,702	1.35 (1.00-1.82)
其他				
超加工食品摄入量	6	248,736	13,760	1.02 (0.95-1.10)
全谷物摄入量	3	79,458	7,209	1.11 (0.97-1.26)
加工肉类摄入量	10	1,091,655	65,703	1.13 (1.05-1.21)
复合维生素	4	348,954	4,443	1.14 (0.98-1.33)
酒精	27	1,849,871	-	1.20 (1.10-1.31)
乳制品	22	576,536	30,259	1.22 (1.11-1.35)
红肉	13	926,695	57,504	1.56 (1.18-2.05)



营养因子类别

维生素 A、C、D、E、K　抗氧化剂　发酵食品与益生菌　饮食模式　其他
B 族维生素　矿物质与微量元素　脂肪酸与脂质

RR > 1 = 与前列腺癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Latest publication per cohort

Include subexposures: Yes