
与前列腺癌（排除仅侵袭性癌证据）风险呈负相关的营养因子
膳食摄入研究的荟萃分析

营养因子	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
叶黄素	2	1,623	677	0.65 (0.49-0.86)
β-胡萝卜素	9	93,912	4,718	0.80 (0.63-1.01)
番茄红素	10	137,731	13,620	0.86 (0.73-1.02)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 C	10	68,446	7,637	0.86 (0.73-1.01)
维生素 E	10	176,954	12,118	0.97 (0.88-1.08)
B 族维生素				
维生素 B6	3	70,879	7,656	0.89 (0.83-0.96)
叶酸	4	65,550	6,813	0.91 (0.71-1.16)
多酚与黄酮类				
绿茶	6	49,170	1,463	0.64 (0.42-0.96)
茶	8	217,811	12,238	0.72 (0.58-0.90)
水果与蔬菜				
大蒜	3	36,604	2,168	0.69 (0.42-1.13)
番茄	9	962,664	63,815	0.73 (0.62-0.87)
豆类	7	1,072,593	74,668	0.88 (0.78-0.98)
脂肪酸与脂质				
二十碳五烯酸	2	430,507	7,761	0.95 (0.79-1.15)
植物雌激素				
染料木黄酮	2	43,907	440	0.54 (0.37-0.80)
大豆	8	85,059	5,399	0.60 (0.41-0.89)
草本与植物制品				
银杏	2	38,308	1,665	0.93 (0.68-1.27)
代谢物与氨基酸				
膳食蛋白质摄入量	2	109,557	3,064	0.99 (0.89-1.11)
饮食模式				
植物性饮食	2	211,318	24,516	0.91 (0.84-0.99)
其他				
不溶性膳食纤维摄入量	2	57,649	6,553	0.68 (0.38-1.23)
可溶性膳食纤维摄入量	2	26,552	4,437	0.89 (0.81-0.97)
总膳食纤维摄入量	6	917,741	58,485	0.92 (0.84-1.02)
鸡蛋	3	900,752	53,381	0.99 (0.96-1.02)



RR < 1 = 与前列腺癌（排除仅侵袭性癌证据）风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时）

Latest publication per cohort

Include subexposures: Yes