
# Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op agressieve prostaatkanker

| Blootstelling | Onderzoeken | N | Gevallen | Gepoolde RR (95%-BI) |
|---|---|---|---|---|
| ***MINERALEN EN SPORENELEMENTEN*** | | | | |
| **Calcium** | 6 | 98,931 | - | *1.53 (0.98-2.38)* |
| ***VETZUREN EN LIPIDEN*** | | | | |
| **Alfa-linoleenzuur** | 3 | 383,989 | 3,504 | *1.85 (1.03-3.31)* |
| **Omega 3-vetzuren** | 3 | 383,989 | 3,504 | *1.85 (1.03-3.31)* |
| **Meervoudig onverzadigd vet (PUFA)** | 4 | 385,026 | - | *1.97 (1.16-3.35)* |
| **Enkelvoudig onverzadigd vet (MUFA)** | 2 | 2,234 | - | *2.39 (1.37-4.15)* |
| ***VOEDINGSPATRONEN*** | | | | |
| **Mediterraan dieet** | 2 | 106,146 | - | *1.02 (0.92-1.13)* |
| ***OVERIG*** | | | | |
| **Multivitaminen** | 2 | 343,481 | 2,040 | *1.27 (1.04-1.56)* |
| **Alcohol** | 4 | 166,503 | - | *1.28 (0.73-2.26)* |
| **Zuivel** | 2 | 80,266 | 439 | *1.39 (1.08-1.78)* |
| **Inname van bewerkt vlees** | 3 | 177,383 | 2,103 | *1.41 (1.20-1.65)* |
| **Rood vlees** | 4 | 101,424 | 1,376 | *1.57 (1.20-2.05)* |




*RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op agressieve prostaatkanker. |◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal onderzoeken) |◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) |◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn onder BI = 95%-voorspellingsinterval (indien beschikbaar) | pijlpunt = interval loopt door buiten de as*

Include subexposures: Yes

Geen gepubliceerd basisrisico voor dit subtype: HR ≈ RR ≈ OR. Ontbrekende aantallen gevallen worden niet geschat.