
# 与侵袭性前列腺癌风险呈正相关的营养因子
膳食摄入研究的荟萃分析

| 营养因子 | 研究数 | 样本量 | 病例数 | 合并 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| 矿物质与微量元素 | | | | |
| 钙 | 5 | 98,670 | - | 1.62 (0.92-2.84) |
| 脂肪酸与脂质 | | | | |
| α-亚麻酸 | 3 | 383,989 | 3,504 | 1.85 (1.03-3.31) |
| Omega-3 脂肪酸 | 3 | 383,989 | 3,504 | 1.85 (1.03-3.31) |
| 多不饱和脂肪（PUFA） | 4 | 385,026 | - | 1.97 (1.16-3.35) |
| 单不饱和脂肪（MUFA） | 2 | 2,234 | - | 2.39 (1.37-4.15) |
| 饮食模式 | | | | |
| 地中海饮食 | 2 | 106,146 | - | 1.02 (0.92-1.13) |
| 其他 | | | | |
| 复合维生素 | 2 | 343,481 | 2,040 | 1.27 (1.04-1.56) |
| 酒精 | 4 | 166,503 | - | 1.28 (0.73-2.26) |
| 乳制品 | 2 | 80,266 | 439 | 1.39 (1.08-1.78) |
| 加工肉类摄入量 | 3 | 177,383 | 2,103 | 1.41 (1.20-1.65) |
| 红肉 | 4 | 101,424 | 1,376 | 1.57 (1.20-2.05) |




RR > 1 = 与侵袭性前列腺癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: Yes

无已发表的亚型基线风险：采用 HR ≈ RR ≈ OR 近似。不估算缺失的病例总数。