
# 与前列腺癌（排除仅侵袭性癌证据）风险呈负相关的营养因子

| 营养因子 | 研究数 | 样本量 | 病例数 | 合并 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| 类胡萝卜素 | | | | |
| 玉米黄质 | 4 | 2,106 | 808 | 0.66 (0.40-1.08) |
| 番茄红素 | 19 | 291,729 | 26,444 | 0.86 (0.79-0.94) |
| β-胡萝卜素 | 14 | 121,104 | 7,521 | 0.93 (0.77-1.13) |
| 维生素 A、C、D、E、K | | | | |
| 维生素 K | 2 | 12,063 | 518 | 0.73 (0.58-0.92) |
| 维生素 C | 11 | 68,944 | 7,699 | 0.87 (0.75-1.03) |
| 维生素 E | 25 | 404,649 | 36,660 | 0.94 (0.87-1.02) |
| B 族维生素 | | | | |
| 维生素 B6 | 3 | 70,879 | 7,656 | 0.89 (0.83-0.96) |
| 矿物质与微量元素 | | | | |
| 硒 | 27 | 355,464 | 29,777 | 0.77 (0.67-0.89) |
| 多酚与黄酮类 | | | | |
| 绿茶 | 6 | 49,170 | 1,463 | 0.64 (0.42-0.96) |
| 茶 | 9 | 264,478 | 15,275 | 0.77 (0.65-0.91) |
| 水果与蔬菜 | | | | |
| 大蒜 | 3 | 36,604 | 2,168 | 0.69 (0.42-1.13) |
| 番茄 | 11 | 1,057,923 | 67,108 | 0.74 (0.64-0.85) |
| 豆类 | 8 | 1,155,076 | 79,072 | 0.89 (0.81-0.97) |
| 脂肪酸与脂质 | | | | |
| 亚油酸 | 7 | 8,735 | 3,057 | 0.71 (0.50-0.99) |
| 油酸 | 2 | 58,714 | 851 | 0.80 (0.24-2.64) |
| Omega-6 脂肪酸 | 9 | 262,978 | 4,988 | 0.87 (0.69-1.10) |
| 鱼油 | 2 | 37,289 | 1,735 | 0.89 (0.68-1.17) |
| 二十二碳六烯酸 | 3 | 144,141 | 7,729 | 0.94 (0.74-1.20) |
| Omega-9 脂肪酸 | 3 | 200,953 | 7,887 | 0.98 (0.65-1.47) |
| 二十碳五烯酸 | 5 | 444,156 | 13,552 | 0.99 (0.89-1.11) |
| 植物雌激素 | | | | |
| 大豆 | 8 | 85,059 | 5,399 | 0.60 (0.41-0.89) |
| 染料木黄酮 | 8 | 64,298 | 3,531 | 0.66 (0.52-0.84) |
| 草本与植物制品 | | | | |
| 银杏 | 2 | 38,308 | 1,665 | 0.93 (0.68-1.27) |
| 代谢物与氨基酸 | | | | |
| 膳食蛋白质摄入量 | 2 | 109,557 | 3,064 | 0.99 (0.89-1.11) |
| 激素与内源性物质 | | | | |
| 褪黑素 | 3 | 4,618 | 1,414 | 0.75 (0.45-1.23) |
| 饮食模式 | | | | |
| 植物性饮食 | 2 | 211,318 | 24,516 | 0.91 (0.84-0.99) |
| 其他 | | | | |
| 不溶性膳食纤维摄入量 | 2 | 57,649 | 6,553 | 0.68 (0.38-1.23) |
| 可溶性膳食纤维摄入量 | 3 | 80,888 | 10,851 | 0.89 (0.83-0.96) |
| 总膳食纤维摄入量 | 7 | 972,077 | 64,899 | 0.92 (0.86-1.00) |
| 鸡蛋 | 3 | 900,752 | 53,381 | 0.99 (0.96-1.02) |




营养因子类别

- 类胡萝卜素
- 维生素 A、C、D、E、K
- B 族维生素
- 矿物质与微量元素
- 多酚与黄酮类
- 水果与蔬菜
- 脂肪酸与脂质
- 植物雌激素
- 草本与植物制品
- 代谢物与氨基酸
- 激素与内源性物质
- 饮食模式
- 其他

RR < 1 = 与前列腺癌（排除仅侵袭性癌证据）风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: Yes