
Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op agressieve prostaatkanker
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Onderzoeken	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
MINERALEN EN SPORENELEMENTEN				
Calcium	4	50,889	-	*1.38 (0.71-2.68)*
VETZUREN EN LIPIDEN				
Alfa-linoleenzuur	3	383,989	3,504	*1.85 (1.03-3.31)*
Enkelvoudig onverzadigd vet (MUFA)	2	2,234	-	*2.39 (1.37-4.15)*
VOEDINGSPATRONEN				
Mediterraan dieet	2	106,146	-	*1.02 (0.92-1.13)*
OVERIG				
Multivitaminen	2	343,481	2,040	*1.27 (1.04-1.56)*
Alcohol	4	166,503	-	*1.28 (0.73-2.26)*
Zuivel	2	80,266	439	*1.39 (1.08-1.78)*
Inname van bewerkt vlees	3	177,383	2,103	*1.41 (1.20-1.65)*
Rood vlees	3	53,569	1,250	*1.47 (1.11-1.95)*



RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op agressieve prostaatkanker. |◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal onderzoeken) |◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) |◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn onder BI = 95%-voorspellingsinterval (indien beschikbaar) | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Latest publication per cohort

Include subexposures: No

Geen gepubliceerd basisrisico voor dit subtype: HR ≈ RR ≈ OR. Ontbrekende aantallen gevallen worden niet geschat.