Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op blaaskanker
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
CAROTENOÏDEN				
Lycopeen	2	222,535	1,249	*1.05 (0.87-1.28)*
B-VITAMINEN				
Vitamine B1	3	575,001	3,737	*1.03 (0.88-1.20)*
MINERALEN EN SPORENELEMENTEN				
Calcium	3	493,396	1,881	*1.17 (0.83-1.64)*
OVERIG				
Inname van ultrabewerkte voedingsmiddelen	2	647,537	1,906	*1.07 (0.91-1.26)*
Inname van bewerkt vlees	8	939,835	6,986	*1.10 (0.99-1.22)*
Rood vlees	9	1,417,360	6,876	*1.32 (1.11-1.57)*
Eieren	2	1,995	355	*3.86 (2.65-5.62)*



Blootstellingsgroep
Carotenoïden
B-vitaminen
Mineralen en sporenelementen
Overig

RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op blaaskanker. |◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) |◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) |◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn onder BI = 95%-voorspellingsinterval (indien beschikbaar) | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Latest publication per cohort

Include subexposures: No