
与前列腺癌风险呈负相关的营养因子

营养因子	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
玉米黄质	4	2,106	808	0.66 (0.40-1.08)
番茄红素	17	176,352	19,203	0.82 (0.73-0.92)
β-胡萝卜素	14	93,008	-	0.89 (0.73-1.09)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 C	11	68,944	7,699	0.87 (0.75-1.03)
维生素 E	17	216,480	25,755	0.93 (0.85-1.03)
B 族维生素				
维生素 B6	3	70,879	7,656	0.89 (0.83-0.96)
矿物质与微量元素				
硒	23	250,938	27,209	0.72 (0.60-0.87)
多酚与黄酮类				
绿茶	7	99,090	1,577	0.62 (0.43-0.89)
茶	9	267,731	12,352	0.71 (0.57-0.87)
水果与蔬菜				
大蒜	3	36,604	2,168	0.69 (0.42-1.13)
番茄	9	962,664	63,815	0.73 (0.62-0.87)
豆类	7	1,072,593	74,668	0.88 (0.78-0.98)
脂肪酸与脂质				
亚油酸	7	8,735	3,057	0.71 (0.50-0.99)
油酸	2	58,714	851	0.80 (0.24-2.64)
鱼油	2	37,289	1,735	0.89 (0.68-1.17)
二十二碳六烯酸	3	144,141	7,729	0.94 (0.74-1.20)
Omega-6 脂肪酸	2	254,243	1,931	0.96 (0.79-1.17)
二十碳五烯酸	5	444,156	13,552	0.99 (0.89-1.11)
植物雌激素				
大豆	8	85,059	5,399	0.60 (0.41-0.89)
染料木黄酮	8	89,310	2,868	0.70 (0.50-0.98)
草本与植物制品				
银杏	2	38,308	1,665	0.93 (0.68-1.27)
代谢物与氨基酸				
膳食蛋白质摄入量	2	109,557	3,064	0.99 (0.89-1.11)
激素与内源性物质				
褪黑素	3	4,618	1,414	0.75 (0.45-1.23)
饮食模式				
植物性饮食	2	211,318	24,516	0.91 (0.84-0.99)
DASH饮食	2	152,714	-	0.93 (0.82-1.06)
其他				
不溶性膳食纤维摄入量	3	101,084	-	0.62 (0.38-1.03)
可溶性膳食纤维摄入量	2	26,552	4,437	0.89 (0.81-0.97)
总膳食纤维摄入量	6	917,741	58,485	0.92 (0.84-1.02)
鸡蛋	3	900,752	53,381	0.99 (0.96-1.02)



营养因子类别

类胡萝卜素 · 维生素 A、C、D、E、K · B 族维生素 · 矿物质与微量元素 · 多酚与黄酮类 · 水果与蔬菜 · 脂肪酸与脂质 · 植物雌激素 · 草本与植物制品 · 代谢物与氨基酸 · 激素与内源性物质 · 饮食模式 · 其他

RR < 1 = 与前列腺癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Latest publication per cohort

Include subexposures: No