
전립선암 (공격성 암에만 해당하는 근거 제외) 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인
식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	연구 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 A	5	3,207	1,358	1.12 (0.63-1.99)
비타민 D	3	247,791	29,373	1.34 (0.90-2.01)
비타민 B군				
비타민 B12	2	719	245	1.47 (1.02-2.12)
항산화제				
항산화제	2	50,507	7,155	1.08 (0.76-1.54)
무기질 및 미량 원소				
철	4	183,783	11,462	1.02 (0.94-1.10)
셀레늄	10	235,441	18,652	1.02 (0.93-1.12)
아연	8	47,636	6,169	1.12 (0.86-1.45)
칼슘	16	673,101	45,112	1.17 (1.07-1.27)
발효 식품 및 프로바이오틱스				
요구르트	3	201,324	7,680	1.25 (1.00-1.56)
발효식품	3	3,460	339	1.37 (0.76-2.45)
지방산 및 지질				
알파-리놀렌산	3	172,482	9,151	1.13 (0.89-1.44)
단일불포화지방(MUFA)	3	52,677	5,049	1.31 (1.00-1.73)
다중불포화지방(PUFA)	3	62,799	5,710	1.60 (0.97-2.64)
식사 패턴				
서구식 식이 패턴	2	44,462	1,702	1.35 (1.00-1.82)
기타				
종합비타민	2	5,473	2,403	1.02 (0.84-1.25)
초가공식품 섭취	6	248,736	13,760	1.02 (0.95-1.10)
가공육 섭취	8	1,089,615	64,702	1.09 (1.02-1.17)
통곡물 섭취	3	79,458	7,209	1.11 (0.97-1.26)
알코올	27	1,911,711	47,035	1.20 (1.10-1.31)
유제품	23	688,143	33,749	1.22 (1.11-1.34)
붉은 고기	10	873,126	56,254	1.60 (1.15-2.23)



노출 요인군
비타민 A, C, D, E, K
비타민 B군
항산화제
무기질 및 미량 원소
발효 식품 및 프로바이오틱스
지방산 및 지질
식사 패턴
기타

RR > 1 = 전립선암 (공격성 암에만 해당하는 근거 제외) 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우) | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: No