
# 与膀胱癌风险呈负相关的营养因子

| 营养因子 | 估计值数 | 样本量 | 病例数 | 合并 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **类胡萝卜素** | | | | |
| 叶黄素 | 3 | 122,821 | 1,415 | 0.69 (0.38-1.27) |
| β-胡萝卜素 | 6 | 368,253 | 2,305 | 0.83 (0.66-1.04) |
| 番茄红素 | 3 | 222,792 | 1,333 | 0.95 (0.90-1.00) |
| **维生素 A、C、D、E、K** | | | | |
| 维生素 A | 4 | 126,541 | 1,142 | 0.72 (0.52-0.98) |
| 维生素 C | 3 | 8,606 | 902 | 0.75 (0.56-1.01) |
| 维生素 D | 10 | 339,695 | 4,466 | 0.75 (0.35-1.63) |
| 维生素 E | 5 | 158,299 | 1,839 | 0.76 (0.58-1.00) |
| **B 族维生素** | | | | |
| 叶酸 | 5 | 309,245 | 2,289 | 0.77 (0.61-0.99) |
| **矿物质与微量元素** | | | | |
| 硒 | 8 | 161,440 | 3,121 | 0.73 (0.54-0.97) |
| 磷 | 2 | 1,147 | 522 | 0.97 (0.27-3.50) |
| **多酚与黄酮类** | | | | |
| 茶 | 9 | 580,076 | 9,039 | 0.96 (0.79-1.17) |
| **水果与蔬菜** | | | | |
| 豆类 | 2 | 2,541 | 1,268 | 0.64 (0.43-0.95) |
| 牛油果 | 2 | 112,328 | 1,165 | 0.78 (0.60-1.01) |
| **发酵食品与益生菌** | | | | |
| 酸奶 | 2 | 101,981 | 906 | 0.64 (0.25-1.66) |
| 发酵食品 | 5 | 203,999 | 2,474 | 0.75 (0.50-1.12) |
| **脂肪酸与脂质** | | | | |
| Omega-3 脂肪酸 | 2 | 1,061 | 572 | 0.31 (0.20-0.48) |
| 单不饱和脂肪（MUFA） | 2 | 648,914 | 3,592 | 0.95 (0.44-2.05) |
| **代谢物与氨基酸** | | | | |
| 植物蛋白质摄入量 | 2 | 585,408 | 2,402 | 0.84 (0.70-1.00) |
| **其他** | | | | |
| 全谷物摄入量 | 3 | 219,042 | 1,666 | 0.72 (0.52-1.01) |
| 乳制品 | 10 | 799,763 | 5,469 | 0.83 (0.65-1.05) |
| 总膳食纤维摄入量 | 2 | 676,447 | 3,990 | 0.85 (0.76-0.95) |
| 酒精 | 11 | 882,294 | 8,649 | 0.86 (0.74-1.00) |




营养因子类别

类胡萝卜素 · 维生素 A、C、D、E、K · B 族维生素 · 矿物质与微量元素 · 多酚与黄酮类 · 水果与蔬菜 · 发酵食品与益生菌 · 脂肪酸与脂质 · 代谢物与氨基酸 · 其他

RR < 1 = 与膀胱癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No