
與侵襲性前列腺癌風險呈正相關的營養因子

營養因子	研究數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
礦物質與微量元素				
鈣	6	98,931	-	1.53 (0.98-2.38)
脂肪酸與脂質				
α-亞麻酸	3	383,989	3,504	1.85 (1.03-3.31)
單元不飽和脂肪（MUFA）	2	2,234	-	2.39 (1.37-4.15)
飲食模式				
地中海飲食	2	106,146	-	1.02 (0.92-1.13)
其他				
綜合維生素	2	343,481	2,040	1.27 (1.04-1.56)
酒精	4	166,503	-	1.28 (0.73-2.26)
乳製品	2	80,266	439	1.39 (1.08-1.78)
加工肉類攝取量	3	177,383	2,103	1.41 (1.20-1.65)
紅肉	4	101,424	1,376	1.57 (1.20-2.05)



RR > 1 = 與侵襲性前列腺癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時） | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No

無已發表的亞型基線風險：採用 HR ≈ RR ≈ OR 近似。不估算缺失的病例總數。