
與侵襲性前列腺癌風險呈負相關的營養因子

營養因子	研究數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
茄紅素	2	166,781	-	0.58 (0.39-0.87)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 E	4	114,280	-	0.64 (0.40-1.04)
維生素 D	7	45,247	-	0.74 (0.51-1.08)
礦物質與微量元素				
硒	5	123,475	-	0.65 (0.37-1.12)
鋅	2	82,482	-	0.84 (0.17-4.29)
水果與蔬菜				
番茄	3	124,620	-	0.70 (0.54-0.90)
其他				
總膳食纖維攝取量	2	885,584	5,076	0.86 (0.63-1.17)



營養因子類別

類胡蘿蔔素　維生素 A、C、D、E、K　礦物質與微量元素　水果與蔬菜　其他

RR < 1 = 與侵襲性前列腺癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時） | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

無已發表的亞型基線風險：採用 HR ≈ RR ≈ OR 近似。不估算缺失的病例總數。

Include subexposures: No