
與前列腺癌風險呈負相關的營養因子
膳食攝取研究的統合分析

營養因子	研究數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
葉黃素	2	1,623	677	0.65 (0.49-0.86)
β-胡蘿蔔素	10	94,949	-	0.79 (0.63-0.98)
茄紅素	13	282,888	22,602	0.88 (0.79-0.98)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 C	10	68,446	7,637	0.86 (0.73-1.01)
維生素 E	13	270,107	13,301	0.95 (0.86-1.06)
B 群維生素				
葉酸	5	131,386	-	0.89 (0.72-1.09)
維生素 B6	3	70,879	7,656	0.89 (0.83-0.96)
多酚與類黃酮				
綠茶	7	99,090	1,577	0.62 (0.43-0.89)
茶	10	314,398	15,389	0.75 (0.64-0.89)
水果與蔬菜				
大蒜	3	36,604	2,168	0.69 (0.42-1.13)
番茄	11	1,057,923	67,108	0.74 (0.64-0.85)
豆類	8	1,155,076	79,072	0.89 (0.81-0.97)
脂肪酸與脂質				
二十碳五烯酸	2	430,507	7,761	0.95 (0.79-1.15)
植物雌激素				
黃豆	8	85,059	5,399	0.60 (0.41-0.89)
染料木黃酮	3	70,911	727	0.78 (0.37-1.63)
草本與植物製品				
銀杏	2	38,308	1,665	0.93 (0.68-1.27)
代謝物與胺基酸				
膳食蛋白質攝取量	2	109,557	3,064	0.99 (0.89-1.11)
飲食模式				
植物性飲食	2	211,318	24,516	0.91 (0.84-0.99)
DASH飲食	2	152,714	-	0.93 (0.82-1.06)
其他				
非水溶性膳食纖維攝取量	3	101,084	-	0.62 (0.38-1.03)
水溶性膳食纖維攝取量	3	80,888	10,851	0.89 (0.83-0.96)
總膳食纖維攝取量	7	972,077	64,899	0.92 (0.86-1.00)
雞蛋	3	900,752	53,381	0.99 (0.96-1.02)



RR < 1 = 與前列腺癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時）

Include subexposures: No