
# 與攝護腺癌（排除僅侵襲性癌證據）風險呈負相關的營養因子
## 膳食攝取研究的統合分析

| 營養因子 | 研究數 | 樣本數 | 病例數 | 合併 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **類胡蘿蔔素** | | | | |
| 葉黃素 | 2 | 1,623 | 677 | 0.65 (0.49-0.86) |
| β-胡蘿蔔素 | 9 | 93,912 | 4,718 | 0.80 (0.63-1.01) |
| 茄紅素 | 13 | 282,888 | 22,602 | 0.88 (0.79-0.98) |
| **維生素 A、C、D、E、K** | | | | |
| 維生素 C | 10 | 68,446 | 7,637 | 0.86 (0.73-1.01) |
| 維生素 E | 13 | 270,107 | 13,301 | 0.95 (0.86-1.06) |
| **B 群維生素** | | | | |
| 維生素 B6 | 3 | 70,879 | 7,656 | 0.89 (0.83-0.96) |
| 葉酸 | 4 | 65,550 | 6,813 | 0.91 (0.71-1.16) |
| **多酚與類黃酮** | | | | |
| 綠茶 | 6 | 49,170 | 1,463 | 0.64 (0.42-0.96) |
| 茶 | 9 | 264,478 | 15,275 | 0.77 (0.65-0.91) |
| **水果與蔬菜** | | | | |
| 大蒜 | 3 | 36,604 | 2,168 | 0.69 (0.42-1.13) |
| 番茄 | 11 | 1,057,923 | 67,108 | 0.74 (0.64-0.85) |
| 豆類 | 8 | 1,155,076 | 79,072 | 0.89 (0.81-0.97) |
| **脂肪酸與脂質** | | | | |
| 二十碳五烯酸 | 2 | 430,507 | 7,761 | 0.95 (0.79-1.15) |
| Omega-3 脂肪酸 | 3 | 98,585 | 8,483 | 0.96 (0.85-1.08) |
| **植物雌激素** | | | | |
| 染料木黃酮 | 2 | 43,907 | 440 | 0.54 (0.37-0.80) |
| 黃豆 | 8 | 85,059 | 5,399 | 0.60 (0.41-0.89) |
| **草本與植物製品** | | | | |
| 銀杏 | 2 | 38,308 | 1,665 | 0.93 (0.68-1.27) |
| **代謝物與胺基酸** | | | | |
| 膳食蛋白質攝取量 | 2 | 109,557 | 3,064 | 0.99 (0.89-1.11) |
| **飲食模式** | | | | |
| 植物性飲食 | 2 | 211,318 | 24,516 | 0.91 (0.84-0.99) |
| **其他** | | | | |
| 非水溶性膳食纖維攝取量 | 2 | 57,649 | 6,553 | 0.68 (0.38-1.23) |
| 水溶性膳食纖維攝取量 | 3 | 80,888 | 10,851 | 0.89 (0.83-0.96) |
| 總膳食纖維攝取量 | 7 | 972,077 | 64,899 | 0.92 (0.86-1.00) |
| 雞蛋 | 3 | 900,752 | 53,381 | 0.99 (0.96-1.02) |




RR < 1 = 與攝護腺癌（排除僅侵襲性癌證據）風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時）

Include subexposures: No