
與腎細胞癌風險呈負相關的營養因子

營養因子	估計值數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
葉黃素	5	881,922	4,765	0.77 (0.68-0.87)
玉米黃素	2	781,129	2,616	0.79 (0.67-0.93)
β-胡蘿蔔素	5	881,922	4,765	0.98 (0.70-1.36)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 E	4	127,855	2,404	0.67 (0.45-0.99)
維生素 C	5	128,222	2,559	0.76 (0.61-0.94)
維生素 D	9	153,812	2,840	0.82 (0.67-1.00)
B 群維生素				
維生素 B12	2	1,959	730	0.63 (0.47-0.85)
維生素 B1	2	4,597	1,909	0.71 (0.55-0.92)
維生素 B6	3	3,861	1,547	0.74 (0.40-1.40)
葉酸	6	84,212	3,088	0.76 (0.50-1.17)
維生素 B2	3	3,861	1,547	0.84 (0.68-1.04)
礦物質與微量元素				
硒	2	3,471	1,543	0.53 (0.04-7.15)
鈣	2	2,273	154	0.62 (0.16-2.40)
多酚與類黃酮				
茶	4	804,643	2,861	0.71 (0.51-1.00)
其他				
酒精	21	3,860,985	11,926	0.72 (0.65-0.79)
總膳食纖維攝取量	2	4,410	1,621	0.85 (0.64-1.12)



RR < 1 = 與腎細胞癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時） | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No