
공격성 전립선암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인

노출 요인	연구 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
무기질 및 미량 원소				
칼슘	5	51,150	-	1.35 (0.85–2.15)
지방산 및 지질				
알파-리놀렌산	3	383,989	3,504	1.85 (1.03–3.31)
오메가-3 지방산	3	383,989	3,504	1.85 (1.03–3.31)
다중불포화지방(PUFA)	4	385,026	-	1.97 (1.16–3.35)
단일불포화지방(MUFA)	2	2,234	-	2.39 (1.37–4.15)
식사 패턴				
지중해식 식단	2	106,146	-	1.02 (0.92–1.13)
기타				
종합비타민	2	343,481	2,040	1.27 (1.04–1.56)
알코올	4	166,503	-	1.28 (0.73–2.26)
유제품	2	80,266	439	1.39 (1.08–1.78)
가공육 섭취	3	177,383	2,103	1.41 (1.20–1.65)
붉은 고기	3	53,569	1,250	1.47 (1.11–1.95)



RR > 1 = 공격성 전립선암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우) | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Latest publication per cohort

Include subexposures: Yes

발표된 아형 기저 위험 없음: HR ≈ RR ≈ OR 근사. 누락된 증례 수는 추정하지 않습니다.