
전립선암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인
식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	연구 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 A	5	3,207	1,358	1.12 (0.63–1.99)
비타민 D	3	247,791	29,373	1.34 (0.90–2.01)
비타민 B군				
비타민 B12	2	719	245	1.47 (1.02–2.12)
항산화제				
항산화제	2	50,507	7,155	1.08 (0.76–1.54)
무기질 및 미량 원소				
셀레늄	9	199,908	18,220	1.01 (0.91–1.13)
철	4	183,783	11,462	1.02 (0.94–1.10)
칼슘	17	674,758	-	1.18 (1.08–1.29)
아연	9	94,876	7,312	1.18 (0.92–1.51)
미네랄 보충제	2	57,251	1,958	1.33 (0.79–2.26)
발효 식품 및 프로바이오틱스				
요구르트	3	201,324	7,680	1.25 (1.00–1.56)
발효식품	3	3,460	339	1.37 (0.76–2.45)
지방산 및 지질				
오메가-9 지방산	2	200,518	7,678	1.08 (0.84–1.40)
오메가-3 지방산	7	577,598	18,792	1.09 (0.96–1.23)
다중불포화지방(PUFA)	12	644,179	-	1.25 (1.10–1.43)
단일불포화지방(MUFA)	7	255,429	-	1.27 (1.08–1.48)
알파-리놀렌산	6	556,471	12,655	1.32 (1.08–1.62)
식사 패턴				
지중해식 식단	2	106,146	7,476	1.00 (0.90–1.11)
서구식 식이 패턴	2	44,462	1,702	1.35 (1.00–1.82)
기타				
초가공식품 섭취	6	248,736	13,760	1.02 (0.95–1.10)
통곡물 섭취	3	79,458	7,209	1.11 (0.97–1.26)
가공육 섭취	10	1,091,655	65,703	1.13 (1.05–1.21)
종합비타민	4	348,954	4,443	1.14 (0.98–1.33)
알코올	27	1,849,871	-	1.20 (1.10–1.31)
유제품	22	576,536	30,259	1.22 (1.11–1.35)
붉은 고기	13	926,695	57,504	1.56 (1.18–2.05)



RR > 1 = 전립선암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우) | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Latest publication per cohort

Include subexposures: Yes