# Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op blaaskanker
## Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

| Blootstelling | Schattingen | N | Gevallen | Gepoolde RR (95%-BI) |
|---|---|---|---|---|
| ***CAROTENOÏDEN*** | | | | |
| **Lycopeen** | 2 | 222,535 | 1,249 | *1.05 (0.87-1.28)* |
| ***B-VITAMINEN*** | | | | |
| **Vitamine B1** | 3 | 575,001 | 3,737 | *1.03 (0.88-1.20)* |
| ***MINERALEN EN SPORENELEMENTEN*** | | | | |
| **Calcium** | 3 | 493,396 | 1,881 | *1.17 (0.83-1.64)* |
| ***OVERIG*** | | | | |
| **Inname van ultrabewerkte voedingsmiddelen** | 2 | 647,537 | 1,906 | *1.07 (0.91-1.26)* |
| **Inname van bewerkt vlees** | 8 | 939,835 | 6,986 | *1.10 (0.99-1.22)* |
| **Rood vlees** | 9 | 1,417,360 | 6,876 | *1.32 (1.11-1.57)* |
| **Eieren** | 2 | 1,995 | 355 | *3.86 (2.65-5.62)* |




Blootstellingsgroep
Carotenoïden
B-vitaminen
Mineralen en sporenelementen
Overig

*RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op blaaskanker. |◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) |◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) |◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn onder BI = 95%-voorspellingsinterval (indien beschikbaar) | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as*

Latest publication per cohort

Include subexposures: Yes