
与肾和肾盂癌风险呈正相关的营养因子
膳食摄入研究的荟萃分析

营养因子	估计值数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 A	2	4,597	1,909	1.23 (0.53-2.84)
B 族维生素				
维生素 B1	2	4,597	1,909	1.07 (0.51-2.23)
矿物质与微量元素				
钙	3	494,621	1,367	1.06 (0.90-1.24)
铜	2	95,958	353	2.44 (0.43-13.84)
脂肪酸与脂质				
单不饱和脂肪（MUFA）	2	777,095	1,801	1.39 (0.82-2.35)
代谢物与氨基酸				
膳食蛋白质摄入量	2	776,349	2,168	1.30 (0.76-2.24)
其他				
含糖饮料摄入量	4	599,592	1,649	1.13 (0.98-1.30)
加工肉类摄入量	6	1,766,660	5,212	1.15 (0.94-1.41)
超加工食品摄入量	3	1,127,884	4,245	1.18 (1.08-1.30)
非营养性甜味剂摄入量	2	115,981	473	1.28 (1.00-1.63)
红肉	6	1,768,446	5,800	1.43 (1.13-1.82)
乳制品	6	512,230	2,409	1.57 (1.10-2.25)



RR > 1 = 与肾和肾盂癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠

Latest publication per cohort

Include subexposures: Yes