
# 공격성 전립선암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인

| 노출 요인 | 연구 수 | 표본 크기 | 증례 수 | 통합 RR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|
| **카로티노이드** | | | | |
| 라이코펜 | 2 | 166,781 | - | 0.58 (0.39-0.87) |
| **비타민 A, C, D, E, K** | | | | |
| 비타민 E | 4 | 114,280 | - | 0.64 (0.40-1.04) |
| 비타민 D | 7 | 45,247 | - | 0.74 (0.51-1.08) |
| **무기질 및 미량 원소** | | | | |
| 셀레늄 | 5 | 123,475 | - | 0.65 (0.37-1.12) |
| 아연 | 2 | 82,482 | - | 0.84 (0.17-4.29) |
| **과일 및 채소** | | | | |
| 토마토 | 3 | 124,620 | - | 0.70 (0.54-0.90) |
| **기타** | | | | |
| 총 식이섬유 섭취 | 2 | 885,584 | 5,076 | 0.86 (0.63-1.17) |




RR < 1 = 공격성 전립선암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우) | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

발표된 아형 기저 위험 없음: HR ≈ RR ≈ OR 근사. 누락된 증례 수는 추정하지 않습니다.

Include subexposures: Yes