
전립선암 (공격성 암에만 해당하는 근거 제외) 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인

노출 요인	연구 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
루테인	5	3,128	1,292	1.00 (0.63-1.61)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 D	26	547,664	63,207	1.14 (1.08-1.20)
비타민 A	13	70,012	17,837	1.15 (0.93-1.42)
비타민 B군				
엽산	9	91,771	19,124	1.03 (0.96-1.11)
비타민 B12	5	5,961	2,681	1.12 (0.97-1.28)
항산화제				
항산화제	3	56,601	7,271	1.15 (0.87-1.50)
코엔자임 Q10	3	36,416	2,065	1.19 (0.79-1.79)
무기질 및 미량 원소				
구리	2	43,360	6,174	1.05 (1.00-1.11)
철	5	184,031	11,578	1.05 (0.94-1.16)
마그네슘	2	43,795	6,400	1.06 (1.01-1.11)
아연	11	49,478	6,840	1.13 (0.85-1.50)
칼슘	24	951,593	55,176	1.14 (1.06-1.23)
발효 식품 및 프로바이오틱스				
요구르트	3	201,324	7,680	1.25 (1.00-1.56)
발효식품	3	3,460	339	1.37 (0.76-2.45)
지방산 및 지질				
도코사펜타엔산(오메가-3)	2	143,344	7,412	1.00 (0.97-1.03)
오메가-3 지방산	9	387,296	22,161	1.01 (0.95-1.09)
알파-리놀렌산	5	173,827	9,647	1.15 (0.92-1.43)
다중불포화지방(PUFA)	4	63,751	6,186	1.24 (0.77-2.02)
단일불포화지방(MUFA)	5	54,581	6,001	1.46 (1.14-1.86)
대사산물 및 아미노산				
글루코사민	3	265,129	16,136	1.06 (1.01-1.11)
콜린	2	8,123	1,372	1.18 (0.83-1.67)
식사 패턴				
서구식 식이 패턴	2	44,462	1,702	1.35 (1.00-1.82)
기타				
종합비타민	4	54,340	5,633	1.01 (0.97-1.04)
초가공식품 섭취	6	248,736	13,760	1.02 (0.95-1.10)
가공육 섭취	8	1,089,615	64,702	1.09 (1.02-1.17)
통곡물 섭취	3	79,458	7,209	1.11 (0.97-1.26)
알코올	27	1,911,711	47,035	1.20 (1.10-1.31)
유제품	23	688,143	33,749	1.22 (1.11-1.34)
붉은 고기	10	873,126	56,254	1.60 (1.15-2.23)



노출 요인군

카로티노이드 · 비타민 A, C, D, E, K · 비타민 B군 · 항산화제 · 무기질 및 미량 원소 · 발효 식품 및 프로바이오틱스 · 지방산 및 지질 · 대사산물 및 아미노산 · 식사 패턴 · 기타

RR > 1 = 전립선암 (공격성 암에만 해당하는 근거 제외) 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우) | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: No