
与前列腺癌（排除仅侵袭性癌证据）风险呈负相关的营养因子

营养因子	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
玉米黄质	4	2,106	808	0.66 (0.40–1.08)
番茄红素	19	291,729	26,444	0.86 (0.79–0.94)
β-胡萝卜素	14	121,104	7,521	0.93 (0.77–1.13)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 K	2	12,063	518	0.73 (0.58–0.92)
维生素 C	11	68,944	7,699	0.87 (0.75–1.03)
维生素 E	25	404,649	36,660	0.94 (0.87–1.02)
B 族维生素				
维生素 B6	3	70,879	7,656	0.89 (0.83–0.96)
矿物质与微量元素				
硒	27	355,464	29,777	0.77 (0.67–0.89)
多酚与黄酮类				
绿茶	6	49,170	1,463	0.64 (0.42–0.96)
茶	9	264,478	15,275	0.77 (0.65–0.91)
水果与蔬菜				
大蒜	3	36,604	2,168	0.69 (0.42–1.13)
番茄	11	1,057,923	67,108	0.74 (0.64–0.85)
豆类	8	1,155,076	79,072	0.89 (0.81–0.97)
脂肪酸与脂质				
亚油酸	7	8,735	3,057	0.71 (0.50–0.99)
油酸	2	58,714	851	0.80 (0.24–2.64)
Omega-6 脂肪酸	9	262,978	4,988	0.87 (0.69–1.10)
鱼油	2	37,289	1,735	0.89 (0.68–1.17)
二十二碳六烯酸	3	144,141	7,729	0.94 (0.74–1.20)
Omega-9 脂肪酸	3	200,953	7,887	0.98 (0.65–1.47)
二十碳五烯酸	5	444,156	13,552	0.99 (0.89–1.11)
植物雌激素				
大豆	8	85,059	5,399	0.60 (0.41–0.89)
染料木黄酮	8	64,298	3,531	0.66 (0.52–0.84)
草本与植物制品				
银杏	2	38,308	1,665	0.93 (0.68–1.27)
代谢物与氨基酸				
膳食蛋白质摄入量	2	109,557	3,064	0.99 (0.89–1.11)
激素与内源性物质				
褪黑素	3	4,618	1,414	0.75 (0.45–1.23)
饮食模式				
植物性饮食	2	211,318	24,516	0.91 (0.84–0.99)
其他				
不溶性膳食纤维摄入量	2	57,649	6,553	0.68 (0.38–1.23)
可溶性膳食纤维摄入量	3	80,888	10,851	0.89 (0.83–0.96)
总膳食纤维摄入量	7	972,077	64,899	0.92 (0.86–1.00)
鸡蛋	3	900,752	53,381	0.99 (0.96–1.02)



营养因子类别

- 类胡萝卜素
- 维生素 A、C、D、E、K
- B 族维生素
- 矿物质与微量元素
- 多酚与黄酮类
- 水果与蔬菜
- 脂肪酸与脂质
- 植物雌激素
- 草本与植物制品
- 代谢物与氨基酸
- 激素与内源性物质
- 饮食模式
- 其他

RR < 1 = 与前列腺癌（排除仅侵袭性癌证据）风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: Yes