
與攝護腺癌（排除僅侵襲性癌證據）風險呈正相關的營養因子

營養因子	研究數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
葉黃素	5	3,128	1,292	1.00 (0.63–1.61)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 D	26	547,664	63,207	1.14 (1.08–1.20)
維生素 A	13	70,012	17,837	1.15 (0.93–1.42)
B 群維生素				
葉酸	9	91,771	19,124	1.03 (0.96–1.11)
維生素 B12	5	5,961	2,681	1.12 (0.97–1.28)
抗氧化劑				
抗氧化劑	3	56,601	7,271	1.15 (0.87–1.50)
輔酶 Q10	3	36,416	2,065	1.19 (0.79–1.79)
礦物質與微量元素				
銅	2	43,360	6,174	1.05 (1.00–1.11)
鐵	5	184,031	11,578	1.05 (0.94–1.16)
鎂	2	43,795	6,400	1.06 (1.01–1.11)
鋅	11	49,478	6,840	1.13 (0.85–1.50)
鈣	24	951,593	55,176	1.14 (1.06–1.23)
發酵食品與益生菌				
優格	3	201,324	7,680	1.25 (1.00–1.56)
發酵食品	3	3,460	339	1.37 (0.76–2.45)
脂肪酸與脂質				
二十二碳五烯酸（ω-3）	2	143,344	7,412	1.00 (0.97–1.03)
Omega-3 脂肪酸	14	560,815	31,749	1.01 (0.96–1.07)
多元不飽和脂肪（PUFA）	21	568,081	36,597	1.02 (0.96–1.09)
α-亞麻酸	5	173,827	9,647	1.15 (0.92–1.43)
單元不飽和脂肪（MUFA）	8	255,534	13,888	1.27 (1.09–1.49)
代謝物與胺基酸				
葡萄糖胺	3	265,129	16,136	1.06 (1.01–1.11)
膽鹼	2	8,123	1,372	1.18 (0.83–1.67)
飲食模式				
西方飲食模式	2	44,462	1,702	1.35 (1.00–1.82)
其他				
綜合維生素	4	54,340	5,633	1.01 (0.97–1.04)
超加工食品攝取量	6	248,736	13,760	1.02 (0.95–1.10)
加工肉類攝取量	8	1,089,615	64,702	1.09 (1.02–1.17)
全穀物攝取量	3	79,458	7,209	1.11 (0.97–1.26)
酒精	27	1,911,711	47,035	1.20 (1.10–1.31)
乳製品	23	688,143	33,749	1.22 (1.11–1.34)
紅肉	10	873,126	56,254	1.60 (1.15–2.23)



RR > 1 = 與攝護腺癌（排除僅侵襲性癌證據）風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時） | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: Yes