
신세포암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인
식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
루테인	5	881,922	4,765	0.77 (0.68–0.87)
제아잔틴	2	781,129	2,616	0.79 (0.67–0.93)
베타-카로틴	5	881,922	4,765	0.98 (0.70–1.36)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 E	4	127,855	2,404	0.67 (0.45–0.99)
비타민 C	5	128,222	2,559	0.76 (0.61–0.94)
비타민 D	2	4,112	767	0.79 (0.65–0.95)
비타민 B군				
비타민 B1	2	4,597	1,909	0.71 (0.55–0.92)
폴리페놀 및 플라보노이드				
차	4	804,643	2,861	0.71 (0.51–1.00)
기타				
알코올	21	3,860,985	11,926	0.72 (0.65–0.79)
총 식이섬유 섭취	2	4,410	1,621	0.85 (0.64–1.12)



RR < 1 = 신세포암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우) | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음

Include subexposures: No