
신장 및 신우암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인
식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
베타-카로틴	5	881,922	4,765	0.76 (0.64–0.90)
루테인	5	881,922	4,765	0.77 (0.68–0.87)
제아잔틴	2	781,129	2,616	0.79 (0.67–0.93)
라이코펜	3	873,444	2,860	0.84 (0.59–1.22)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 E	4	127,855	2,404	0.67 (0.45–0.99)
비타민 C	5	128,222	2,559	0.76 (0.61–0.94)
비타민 D	2	4,112	776	0.79 (0.66–0.95)
비타민 B군				
엽산	2	4,597	1,909	0.74 (0.52–1.05)
폴리페놀 및 플라보노이드				
녹차	2	103,012	536	0.51 (0.24–1.11)
차	5	907,106	3,147	0.73 (0.56–0.95)
지방산 및 지질				
다중불포화지방(PUFA)	3	861,316	2,507	0.94 (0.52–1.71)
기타				
알코올	28	14,214,219	30,116	0.75 (0.68–0.82)
총 식이섬유 섭취	3	198,798	2,632	0.87 (0.78–0.97)



RR < 1 = 신장 및 신우암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 신뢰구간 아래 점선 = 95% 예측구간 (추정 가능한 경우) | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: Yes