
# 与肾和肾盂癌风险呈负相关的营养因子
# 膳食摄入研究的荟萃分析

| 营养因子 | 估计值数 | 样本量 | 病例数 | 合并 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **类胡萝卜素** | | | | |
| β-胡萝卜素 | 5 | 881,922 | 4,765 | 0.76 (0.64–0.90) |
| 叶黄素 | 5 | 881,922 | 4,765 | 0.77 (0.68–0.87) |
| 玉米黄质 | 2 | 781,129 | 2,616 | 0.79 (0.67–0.93) |
| 番茄红素 | 3 | 873,444 | 2,860 | 0.84 (0.59–1.22) |
| **维生素 A、C、D、E、K** | | | | |
| 维生素 E | 4 | 127,855 | 2,404 | 0.67 (0.45–0.99) |
| 维生素 C | 5 | 128,222 | 2,559 | 0.76 (0.61–0.94) |
| 维生素 D | 2 | 4,112 | 776 | 0.79 (0.66–0.95) |
| **B 族维生素** | | | | |
| 叶酸 | 2 | 4,597 | 1,909 | 0.74 (0.52–1.05) |
| **多酚与黄酮类** | | | | |
| 绿茶 | 2 | 103,012 | 536 | 0.51 (0.24–1.11) |
| 茶 | 5 | 907,106 | 3,147 | 0.73 (0.56–0.95) |
| **脂肪酸与脂质** | | | | |
| 多不饱和脂肪（PUFA） | 3 | 861,316 | 2,507 | 0.94 (0.52–1.71) |
| **其他** | | | | |
| 酒精 | 28 | 14,214,219 | 30,116 | 0.75 (0.68–0.82) |
| 总膳食纤维摄入量 | 3 | 198,798 | 2,632 | 0.87 (0.78–0.97) |




RR < 1 = 与肾和肾盂癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: Yes