
# 與腎臟及腎盂癌風險呈正相關的營養因子

| 營養因子 | 估計值數 | 樣本數 | 病例數 | 合併 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **維生素 A、C、D、E、K** | | | | |
| 維生素 A | 2 | 4,597 | 1,909 | 1.23 (0.53–2.84) |
| **B 群維生素** | | | | |
| 維生素 B1 | 2 | 4,597 | 1,909 | 1.07 (0.51–2.23) |
| **礦物質與微量元素** | | | | |
| 銅 | 2 | 95,958 | 353 | 2.44 (0.43–13.84) |
| **脂肪酸與脂質** | | | | |
| 單元不飽和脂肪（MUFA） | 2 | 777,095 | 1,801 | 1.39 (0.82–2.35) |
| **代謝物與胺基酸** | | | | |
| 膳食蛋白質攝取量 | 2 | 776,349 | 2,168 | 1.30 (0.76–2.24) |
| **其他** | | | | |
| 含糖飲料攝取量 | 4 | 599,592 | 1,649 | 1.13 (0.98–1.30) |
| 加工肉類攝取量 | 6 | 1,766,660 | 5,212 | 1.15 (0.94–1.41) |
| 超加工食品攝取量 | 3 | 1,127,884 | 4,245 | 1.18 (1.08–1.30) |
| 非營養性甜味劑攝取量 | 2 | 115,981 | 473 | 1.28 (1.00–1.63) |
| 紅肉 | 6 | 1,768,446 | 5,800 | 1.43 (1.13–1.82) |
| 乳製品 | 6 | 512,230 | 2,409 | 1.57 (1.10–2.25) |




RR > 1 = 與腎臟及腎盂癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 信賴區間下方虛線 = 95% 預測區間（可估計時） | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊

Include subexposures: Yes