방광암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인 식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
라이코펜	2	222,535	1,249	1.05 (0.87-1.28)
비타민 B군				
비타민 B1	3	575,001	3,737	1.03 (0.88-1.20)
대사산물 및 아미노산				
식이 단백질 섭취	2	585,408	2,402	1.12 (1.01-1.23)
동물성 단백질 섭취	2	585,408	2,402	1.15 (1.04-1.28)
기타				
가공육 섭취	7	938,913	6,956	1.09 (0.98-1.21)
붉은 고기	9	1,417,360	6,876	1.32 (1.11-1.57)
달걀	2	1,995	355	3.86 (2.65-5.62)



RR > 1 = 방광암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음

Include subexposures: No