# Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op blaaskanker

| Blootstelling | Schattingen | N | Gevallen | Gepoolde RR (95%-BI) |
|---|---|---|---|---|
| ***B-VITAMINEN*** | | | | |
| **Vitamine B1** | 3 | 575,001 | 3,737 | *1.03 (0.88-1.20)* |
| ***METABOLIETEN EN AMINOZUREN*** | | | | |
| **Eiwitinname via de voeding** | 2 | 585,408 | 2,402 | *1.12 (1.01-1.23)* |
| **Inname van dierlijke eiwitten** | 2 | 585,408 | 2,402 | *1.15 (1.04-1.28)* |
| ***OVERIG*** | | | | |
| **Inname van bewerkt vlees** | 7 | 938,913 | 6,956 | *1.09 (0.98-1.21)* |
| **Rood vlees** | 9 | 1,417,360 | 6,876 | *1.32 (1.11-1.57)* |
| **Eieren** | 2 | 1,995 | 355 | *3.86 (2.65-5.62)* |




Blootstellingsgroep
B-vitaminen
Metabolieten en aminozuren
Overig

*RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op blaaskanker. |◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) |◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) |◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen*

Include subexposures: No