
与膀胱癌风险呈负相关的营养因子

营养因子	估计值数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
叶黄素	3	122,821	1,415	0.69 (0.38-1.27)
β-胡萝卜素	6	368,253	2,305	0.83 (0.66-1.04)
番茄红素	3	222,792	1,333	0.95 (0.90-1.00)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 A	4	126,541	1,142	0.72 (0.52-0.98)
维生素 C	3	8,606	902	0.75 (0.56-1.01)
维生素 D	10	339,695	4,466	0.75 (0.35-1.63)
维生素 E	5	158,299	1,839	0.76 (0.58-1.00)
B 族维生素				
叶酸	5	309,245	2,289	0.77 (0.61-0.99)
矿物质与微量元素				
硒	8	161,440	3,121	0.73 (0.54-0.97)
磷	2	1,147	522	0.97 (0.27-3.50)
多酚与黄酮类				
茶	9	580,076	9,039	0.96 (0.79-1.17)
水果与蔬菜				
豆类	2	2,541	1,268	0.64 (0.43-0.95)
牛油果	2	112,328	1,165	0.78 (0.60-1.01)
发酵食品与益生菌				
酸奶	2	101,981	906	0.64 (0.25-1.66)
发酵食品	5	203,999	2,474	0.75 (0.50-1.12)
脂肪酸与脂质				
Omega-3 脂肪酸	2	1,061	572	0.31 (0.20-0.48)
单不饱和脂肪（MUFA）	2	648,914	3,592	0.95 (0.44-2.05)
代谢物与氨基酸				
植物蛋白质摄入量	2	585,408	2,402	0.84 (0.70-1.00)
其他				
全谷物摄入量	3	219,042	1,666	0.72 (0.52-1.01)
乳制品	8	306,953	3,788	0.73 (0.53-1.01)
总膳食纤维摄入量	2	676,447	3,990	0.85 (0.76-0.95)
酒精	11	882,294	8,649	0.86 (0.74-1.00)



RR < 1 = 与膀胱癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No