
방광암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인
식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
베타-카로틴	5	366,541	1,449	0.88 (0.71–1.10)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 C	3	8,606	902	0.75 (0.56–1.01)
비타민 A	2	121,519	737	0.77 (0.39–1.51)
비타민 E	4	157,524	1,453	0.86 (0.69–1.07)
비타민 B군				
엽산	4	307,597	1,465	0.73 (0.51–1.05)
무기질 및 미량 원소				
인	2	1,147	522	0.97 (0.27–3.50)
폴리페놀 및 플라보노이드				
차	9	580,076	9,039	0.96 (0.79–1.17)
과일 및 채소				
콩류	2	2,541	1,268	0.64 (0.43–0.95)
아보카도	2	112,328	1,165	0.78 (0.60–1.01)
발효 식품 및 프로바이오틱스				
요구르트	2	101,981	906	0.64 (0.25–1.66)
발효식품	5	203,999	2,474	0.75 (0.50–1.12)
지방산 및 지질				
단일불포화지방(MUFA)	2	648,914	3,592	0.95 (0.44–2.05)
대사산물 및 아미노산				
식물성 단백질 섭취	2	585,408	2,402	0.84 (0.70–1.00)
기타				
통곡물 섭취	3	219,042	1,666	0.72 (0.52–1.01)
유제품	8	306,953	3,788	0.73 (0.53–1.01)
총 식이섬유 섭취	2	676,447	3,990	0.85 (0.76–0.95)
알코올	10	881,889	8,536	0.86 (0.74–1.00)



RR < 1 = 방광암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: Yes