
# 与肾和肾盂癌风险呈正相关的营养因子
# 膳食摄入研究的荟萃分析

| 营养因子 | 估计值数 | 样本量 | 病例数 | 合并 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| 维生素 A、C、D、E、K | | | | |
| 维生素 A | 2 | 4,597 | 1,909 | 1.23 (0.53-2.84) |
| B 族维生素 | | | | |
| 维生素 B1 | 2 | 4,597 | 1,909 | 1.07 (0.51-2.23) |
| 矿物质与微量元素 | | | | |
| 铜 | 2 | 95,958 | 353 | 2.44 (0.43-13.84) |
| 代谢物与氨基酸 | | | | |
| 膳食蛋白质摄入量 | 2 | 776,349 | 2,168 | 1.30 (0.76-2.24) |
| 其他 | | | | |
| 含糖饮料摄入量 | 3 | 563,999 | 1,503 | 1.11 (0.96-1.28) |
| 加工肉类摄入量 | 6 | 1,766,660 | 5,212 | 1.15 (0.94-1.41) |
| 红肉 | 6 | 1,768,446 | 5,800 | 1.43 (1.13-1.82) |
| 乳制品 | 4 | 19,420 | 1,051 | 2.22 (1.24-3.97) |




营养因子类别

维生素 A、C、D、E、K　B 族维生素　矿物质与微量元素　代谢物与氨基酸　其他

RR > 1 = 与肾和肾盂癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No