
与肾细胞癌风险呈正相关的营养因子
膳食摄入研究的荟萃分析

营养因子	估计值数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
番茄红素	3	873,444	2,860	1.02 (0.73-1.42)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 A	2	4,597	1,909	1.23 (0.53-2.87)
B 族维生素				
叶酸	2	4,597	1,909	1.18 (0.60-2.32)
代谢物与氨基酸				
膳食蛋白质摄入量	2	776,349	2,168	1.30 (0.75-2.25)
其他				
加工肉类摄入量	6	1,766,660	5,212	1.15 (0.94-1.41)
红肉	6	1,768,446	5,800	1.43 (1.13-1.81)
乳制品	3	3,506	1,009	2.72 (1.22-6.05)



RR > 1 = 与肾细胞癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No