
与前列腺癌风险呈负相关的营养因子
膳食摄入研究的荟萃分析

营养因子	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
叶黄素	2	1,623	677	0.65 (0.49-0.86)
β-胡萝卜素	10	94,949	-	0.79 (0.63-0.98)
番茄红素	13	282,888	22,602	0.88 (0.79-0.98)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 C	10	68,446	7,637	0.86 (0.73-1.01)
维生素 E	13	270,107	13,301	0.95 (0.86-1.06)
B 族维生素				
叶酸	5	131,386	-	0.89 (0.72-1.09)
维生素 B6	3	70,879	7,656	0.89 (0.83-0.96)
多酚与黄酮类				
绿茶	7	99,090	1,577	0.62 (0.43-0.89)
茶	10	314,398	15,389	0.75 (0.64-0.89)
水果与蔬菜				
大蒜	3	36,604	2,168	0.69 (0.42-1.13)
番茄	11	1,057,923	67,108	0.74 (0.64-0.85)
豆类	8	1,155,076	79,072	0.89 (0.81-0.97)
脂肪酸与脂质				
二十碳五烯酸	2	430,507	7,761	0.95 (0.79-1.15)
植物雌激素				
大豆	8	85,059	5,399	0.60 (0.41-0.89)
染料木黄酮	3	70,911	727	0.78 (0.37-1.63)
草本与植物制品				
银杏	2	38,308	1,665	0.93 (0.68-1.27)
代谢物与氨基酸				
膳食蛋白质摄入量	2	109,557	3,064	0.99 (0.89-1.11)
饮食模式				
植物性饮食	2	211,318	24,516	0.91 (0.84-0.99)
DASH饮食	2	152,714	-	0.93 (0.82-1.06)
其他				
不溶性膳食纤维摄入量	3	101,084	-	0.62 (0.38-1.03)
可溶性膳食纤维摄入量	3	80,888	10,851	0.89 (0.83-0.96)
总膳食纤维摄入量	7	972,077	64,899	0.92 (0.86-1.00)
鸡蛋	3	900,752	53,381	0.99 (0.96-1.02)



RR < 1 = 与前列腺癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No