
與膀胱癌風險呈正相關的營養因子
膳食攝取研究的統合分析

營養因子	估計值數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
茄紅素	2	222,535	1,249	1.05 (0.87–1.28)
B 群維生素				
維生素 B1	3	575,001	3,737	1.03 (0.88–1.20)
植物雌激素				
黃豆	2	32,477	181	1.51 (0.19–12.07)
代謝物與胺基酸				
膳食蛋白質攝取量	2	585,408	2,402	1.12 (1.01–1.23)
動物性蛋白質攝取量	2	585,408	2,402	1.15 (1.04–1.28)
其他				
加工肉類攝取量	7	938,913	6,956	1.09 (0.98–1.21)
紅肉	9	1,417,360	6,876	1.32 (1.11–1.57)
雞蛋	2	1,995	355	3.86 (2.65–5.62)



RR > 1 = 與膀胱癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊

Include subexposures: No