
與腎臟及腎盂癌風險呈正相關的營養因子
膳食攝取研究的統合分析

營養因子	估計值數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 A	2	4,597	1,909	1.23 (0.53–2.84)
B 群維生素				
維生素 B1	2	4,597	1,909	1.07 (0.51–2.23)
礦物質與微量元素				
銅	2	95,958	353	2.44 (0.43–13.84)
代謝物與胺基酸				
膳食蛋白質攝取量	2	776,349	2,168	1.30 (0.76–2.24)
其他				
含糖飲料攝取量	3	563,999	1,503	1.11 (0.96–1.28)
加工肉類攝取量	6	1,766,660	5,212	1.15 (0.94–1.41)
紅肉	6	1,768,446	5,800	1.43 (1.13–1.82)
乳製品	4	19,420	1,051	2.22 (1.24–3.97)



RR > 1 = 與腎臟及腎盂癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No