
與前列腺癌風險呈正相關的營養因子
膳食攝取研究的統合分析

營養因子	研究數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 A	5	3,207	1,358	1.12 (0.63–1.99)
維生素 D	3	247,791	29,373	1.34 (0.90–2.01)
B 群維生素				
維生素 B12	2	719	245	1.47 (1.02–2.12)
抗氧化劑				
抗氧化劑	2	50,507	7,155	1.08 (0.76–1.54)
礦物質與微量元素				
鐵	4	183,783	11,462	1.02 (0.94–1.10)
硒	10	235,441	18,652	1.02 (0.93–1.12)
鋅	9	94,876	7,312	1.18 (0.92–1.51)
鈣	19	770,289	–	1.23 (1.12–1.36)
礦物質補充品	2	57,251	1,958	1.33 (0.79–2.26)
發酵食品與益生菌				
優格	3	201,324	7,680	1.25 (1.00–1.56)
發酵食品	3	3,460	339	1.37 (0.76–2.45)
脂肪酸與脂質				
Omega–3 脂肪酸	4	146,440	8,609	1.04 (0.85–1.28)
α–亞麻酸	6	556,471	12,655	1.32 (1.08–1.62)
單元不飽和脂肪（MUFA）	5	54,911	–	1.47 (1.12–1.93)
多元不飽和脂肪（PUFA）	4	63,836	–	1.74 (1.09–2.77)
飲食模式				
地中海飲食	2	106,146	7,476	1.00 (0.90–1.11)
西方飲食模式	2	44,462	1,702	1.35 (1.00–1.82)
其他				
超加工食品攝取量	3	4,983	2,932	1.10 (0.85–1.42)
全穀物攝取量	3	79,458	7,209	1.11 (0.97–1.26)
加工肉類攝取量	10	1,091,655	65,703	1.13 (1.05–1.21)
綜合維生素	4	348,954	4,443	1.14 (0.98–1.33)
酒精	29	1,934,957	–	1.20 (1.10–1.30)
乳製品	24	739,672	33,998	1.22 (1.12–1.34)
紅肉	14	974,550	57,630	1.60 (1.22–2.10)



RR > 1 = 與前列腺癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No