
与侵袭性前列腺癌风险呈负相关的营养因子

营养因子	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
番茄红素	2	166,781	-	0.58 (0.39-0.87)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 E	4	114,280	-	0.64 (0.40-1.04)
维生素 D	7	45,247	-	0.74 (0.51-1.08)
矿物质与微量元素				
硒	5	123,475	-	0.65 (0.37-1.12)
锌	2	82,482	-	0.84 (0.17-4.29)
水果与蔬菜				
番茄	3	124,620	-	0.70 (0.54-0.90)
其他				
总膳食纤维摄入量	2	885,584	5,076	0.86 (0.63-1.17)



RR < 1 = 与侵袭性前列腺癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

无已发表的亚型基线风险：采用 HR ≈ RR ≈ OR 近似。不估算缺失的病例总数。

Include subexposures: Yes