
與膀胱癌風險呈負相關的營養因子

營養因子	估計值數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
葉黃素	3	122,821	1,415	0.69 (0.38–1.27)
β-胡蘿蔔素	6	368,253	2,305	0.83 (0.66–1.04)
茄紅素	3	222,792	1,333	0.95 (0.90–1.00)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 A	4	126,541	1,142	0.72 (0.52–0.98)
維生素 C	3	8,606	902	0.75 (0.56–1.01)
維生素 D	10	339,695	4,466	0.75 (0.35–1.63)
維生素 E	5	158,299	1,839	0.76 (0.58–1.00)
B 群維生素				
葉酸	5	309,245	2,289	0.77 (0.61–0.99)
礦物質與微量元素				
硒	8	161,440	3,121	0.73 (0.54–0.97)
磷	2	1,147	522	0.97 (0.27–3.50)
多酚與類黃酮				
茶	9	580,076	9,039	0.96 (0.79–1.17)
水果與蔬菜				
豆類	2	2,541	1,268	0.64 (0.43–0.95)
酪梨	2	112,328	1,165	0.78 (0.60–1.01)
發酵食品與益生菌				
優格	2	101,981	906	0.64 (0.25–1.66)
發酵食品	5	203,999	2,474	0.75 (0.50–1.12)
脂肪酸與脂質				
Omega-3 脂肪酸	2	1,061	572	0.31 (0.20–0.48)
多元不飽和脂肪（PUFA）	2	1,061	572	0.40 (0.24–0.67)
Omega-6 脂肪酸	2	1,061	572	0.46 (0.31–0.69)
單元不飽和脂肪（MUFA）	3	649,414	3,842	0.79 (0.41–1.52)
代謝物與胺基酸				
植物性蛋白質攝取量	2	585,408	2,402	0.84 (0.70–1.00)
其他				
全穀物攝取量	3	219,042	1,666	0.72 (0.52–1.01)
乳製品	8	306,953	3,788	0.73 (0.53–1.01)
總膳食纖維攝取量	2	676,447	3,990	0.85 (0.76–0.95)
酒精	12	1,003,146	9,243	0.88 (0.76–1.02)



營養因子類別

類胡蘿蔔素 · 維生素 A、C、D、E、K · B 群維生素 · 礦物質與微量元素 · 多酚與類黃酮 · 水果與蔬菜 · 發酵食品與益生菌 · 脂肪酸與脂質 · 代謝物與胺基酸 · 其他

RR < 1 = 與膀胱癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: Yes