
与前列腺癌风险呈正相关的暴露因素

暴露因素	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
叶黄素	5	3,128	1,292	1.00 (0.63–1.61)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 D	28	551,351	–	1.13 (1.07–1.19)
维生素 A	13	70,012	17,837	1.15 (0.93–1.42)
B 族维生素				
叶酸	10	157,607	–	1.02 (0.95–1.10)
维生素 B12	5	5,961	2,681	1.12 (0.97–1.28)
抗氧化剂				
抗氧化剂	3	56,601	7,271	1.15 (0.87–1.50)
辅酶 Q10	3	36,416	2,065	1.19 (0.79–1.79)
矿物质与微量元素				
铜	2	43,360	6,174	1.05 (1.00–1.11)
铁	5	184,031	11,578	1.05 (0.94–1.16)
镁	3	44,056	6,498	1.05 (0.88–1.25)
钙	28	1,049,042	–	1.18 (1.10–1.28)
锌	12	96,718	7,983	1.18 (0.90–1.54)
矿物质补充剂	2	57,251	1,958	1.33 (0.79–2.26)
发酵食品与益生菌				
酸奶	3	201,324	7,680	1.25 (1.00–1.56)
发酵食品	3	3,460	339	1.37 (0.76–2.45)
脂肪酸与脂质				
二十二碳五烯酸（ω-3）	2	143,344	7,412	1.00 (0.97–1.03)
Omega-3 脂肪酸	28	1,724,608	64,131	1.03 (0.95–1.11)
α-亚麻酸	8	557,816	13,151	1.31 (1.08–1.58)
多不饱和脂肪（PUFA）	44	2,054,278	–	1.37 (0.87–2.17)
单不饱和脂肪（MUFA）	10	257,768	–	1.57 (1.23–1.99)
代谢物与氨基酸				
甜菜碱	3	55,116	963	1.03 (0.61–1.73)
氨基葡萄糖	3	265,129	16,136	1.06 (1.01–1.11)
胆碱	3	8,815	1,545	1.38 (0.92–2.07)
饮食模式				
地中海饮食	2	106,146	7,476	1.00 (0.90–1.11)
西方膳食模式	2	44,462	1,702	1.35 (1.00–1.82)
其他				
复合维生素	6	397,821	7,673	1.02 (0.96–1.09)
鸡蛋	4	928,359	53,580	1.07 (0.88–1.31)
超加工食品摄入量	3	4,983	2,932	1.10 (0.85–1.42)
全谷物摄入量	3	79,458	7,209	1.11 (0.97–1.26)
加工肉类摄入量	11	1,119,262	65,902	1.13 (1.05–1.22)
酒精	29	1,934,957	–	1.20 (1.10–1.30)
乳制品	24	739,672	33,998	1.22 (1.12–1.34)
红肉	15	1,002,157	57,829	1.56 (1.21–2.01)



暴露类别

类胡萝卜素 · 维生素 A、C、D、E、K · B 族维生素 · 抗氧化剂 · 矿物质与微量元素 · 发酵食品与益生菌 · 脂肪酸与脂质 · 代谢物与氨基酸 · 饮食模式 · 其他

RR > 1 = 与前列腺癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外