
与侵袭性前列腺癌风险呈负相关的暴露因素

暴露因素	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
番茄红素	3	216,679	–	0.67 (0.54–0.82)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 E	4	114,280	–	0.64 (0.40–1.04)
维生素 D	7	45,247	–	0.74 (0.51–1.08)
矿物质与微量元素				
硒	5	123,475	–	0.65 (0.37–1.12)
锌	2	82,482	–	0.84 (0.17–4.29)
多酚与黄酮类				
茶	2	192,116	–	0.74 (0.44–1.22)
水果与蔬菜				
番茄	3	124,620	–	0.70 (0.54–0.90)
其他				
总膳食纤维摄入量	2	885,584	5,076	0.86 (0.63–1.17)



RR < 1 = 与侵袭性前列腺癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

无已发表的亚型基线风险：采用 HR ≈ RR ≈ OR 近似。不估算缺失的病例总数。