
공격성 전립선암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인

노출 요인	연구 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
라이코펜	3	216,679	-	0.67 (0.54-0.82)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 E	4	114,280	-	0.64 (0.40-1.04)
비타민 D	7	45,247	-	0.74 (0.51-1.08)
무기질 및 미량 원소				
셀레늄	5	123,475	-	0.65 (0.37-1.12)
아연	2	82,482	-	0.84 (0.17-4.29)
폴리페놀 및 플라보노이드				
차	2	192,116	-	0.74 (0.44-1.22)
과일 및 채소				
토마토	3	124,620	-	0.70 (0.54-0.90)
기타				
총 식이섬유 섭취	2	885,584	5,076	0.86 (0.63-1.17)



RR < 1 = 공격성 전립선암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: No

발표된 아형 기저 위험 없음: HR ≈ RR ≈ OR 근사. 누락된 증례 수는 추정하지 않습니다.