
与侵袭性前列腺癌风险呈正相关的暴露因素

暴露因素	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
矿物质与微量元素				
钙	6	98,931	–	1.53 (0.98–2.38)
脂肪酸与脂质				
α-亚麻酸	3	383,989	3,504	1.85 (1.03–3.31)
单不饱和脂肪（MUFA）	2	2,234	–	2.39 (1.37–4.15)
代谢物与氨基酸				
甜菜碱	3	55,116	963	1.03 (0.60–1.74)
饮食模式				
地中海饮食	2	106,146	–	1.02 (0.92–1.13)
其他				
复合维生素	2	343,481	2,040	1.27 (1.04–1.56)
酒精	4	166,503	–	1.28 (0.73–2.26)
鸡蛋	2	869,756	5,123	1.36 (0.87–2.10)
乳制品	3	101,926	744	1.41 (1.14–1.75)
加工肉类摄入量	4	204,990	2,302	1.41 (1.21–1.65)
红肉	5	129,031	1,575	1.44 (1.13–1.84)



RR > 1 = 与侵袭性前列腺癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No

无已发表的亚型基线风险：采用 HR ≈ RR ≈ OR 近似。不估算缺失的病例总数。