
# 与前列腺癌风险呈正相关的暴露因素
# 膳食摄入研究的荟萃分析

| 暴露因素 | 研究数 | 样本量 | 病例数 | 合并 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **维生素 A、C、D、E、K** | | | | |
| 维生素 A | 5 | 3,207 | 1,358 | 1.12 (0.63–1.99) |
| 维生素 D | 3 | 247,791 | 29,373 | 1.34 (0.90–2.01) |
| **B 族维生素** | | | | |
| 维生素 B12 | 2 | 719 | 245 | 1.47 (1.02–2.12) |
| **抗氧化剂** | | | | |
| 抗氧化剂 | 2 | 50,507 | 7,155 | 1.08 (0.76–1.54) |
| **矿物质与微量元素** | | | | |
| 铁 | 4 | 183,783 | 11,462 | 1.02 (0.94–1.10) |
| 硒 | 10 | 235,441 | 18,652 | 1.02 (0.93–1.12) |
| 锌 | 9 | 94,876 | 7,312 | 1.18 (0.92–1.51) |
| 钙 | 19 | 770,289 | – | 1.23 (1.12–1.36) |
| 矿物质补充剂 | 2 | 57,251 | 1,958 | 1.33 (0.79–2.26) |
| **发酵食品与益生菌** | | | | |
| 酸奶 | 3 | 201,324 | 7,680 | 1.25 (1.00–1.56) |
| 发酵食品 | 3 | 3,460 | 339 | 1.37 (0.76–2.45) |
| **脂肪酸与脂质** | | | | |
| Omega–3 脂肪酸 | 4 | 146,440 | 8,609 | 1.04 (0.85–1.28) |
| α–亚麻酸 | 6 | 556,471 | 12,655 | 1.32 (1.08–1.62) |
| 单不饱和脂肪（MUFA） | 5 | 54,911 | – | 1.47 (1.12–1.93) |
| 多不饱和脂肪（PUFA） | 4 | 63,836 | – | 1.74 (1.09–2.77) |
| **饮食模式** | | | | |
| 地中海饮食 | 2 | 106,146 | 7,476 | 1.00 (0.90–1.11) |
| 西方膳食模式 | 2 | 44,462 | 1,702 | 1.35 (1.00–1.82) |
| **其他** | | | | |
| 鸡蛋 | 4 | 928,359 | 53,580 | 1.07 (0.88–1.31) |
| 超加工食品摄入量 | 3 | 4,983 | 2,932 | 1.10 (0.85–1.42) |
| 全谷物摄入量 | 3 | 79,458 | 7,209 | 1.11 (0.97–1.26) |
| 加工肉类摄入量 | 11 | 1,119,262 | 65,902 | 1.13 (1.05–1.22) |
| 复合维生素 | 4 | 348,954 | 4,443 | 1.14 (0.98–1.33) |
| 酒精 | 29 | 1,934,957 | – | 1.20 (1.10–1.30) |
| 乳制品 | 24 | 739,672 | 33,998 | 1.22 (1.12–1.34) |
| 红肉 | 15 | 1,002,157 | 57,829 | 1.56 (1.21–2.01) |




暴露类别

维生素 A、C、D、E、K　抗氧化剂　发酵食品与益生菌　饮食模式　其他
B 族维生素　矿物质与微量元素　脂肪酸与脂质

RR > 1 = 与前列腺癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No