
与前列腺癌风险呈负相关的暴露因素
膳食摄入研究的荟萃分析

暴露因素	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
叶黄素	2	1,623	677	0.65 (0.49–0.86)
β-胡萝卜素	10	94,949	–	0.79 (0.63–0.98)
番茄红素	13	282,888	22,602	0.88 (0.79–0.98)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 C	10	68,446	7,637	0.86 (0.73–1.01)
维生素 E	13	270,107	13,301	0.95 (0.86–1.06)
B 族维生素				
叶酸	5	131,386	–	0.89 (0.72–1.09)
维生素 B6	3	70,879	7,656	0.89 (0.83–0.96)
多酚与黄酮类				
绿茶	7	99,090	1,577	0.62 (0.43–0.89)
茶	10	314,398	15,389	0.75 (0.64–0.89)
水果与蔬菜				
大蒜	3	36,604	2,168	0.69 (0.42–1.13)
番茄	11	1,057,923	67,108	0.74 (0.64–0.85)
豆类	8	1,155,076	79,072	0.89 (0.81–0.97)
脂肪酸与脂质				
二十碳五烯酸	2	430,507	7,761	0.95 (0.79–1.15)
植物雌激素				
大豆	8	85,059	5,399	0.60 (0.41–0.89)
染料木黄酮	3	70,911	727	0.78 (0.37–1.63)
草本与植物制品				
银杏	2	38,308	1,665	0.93 (0.68–1.27)
代谢物与氨基酸				
甜菜碱	2	54,424	790	0.82 (0.48–1.38)
膳食蛋白质摄入量	2	109,557	3,064	0.99 (0.89–1.11)
饮食模式				
植物性饮食	2	211,318	24,516	0.91 (0.84–0.99)
DASH饮食	2	152,714	–	0.93 (0.82–1.06)
其他				
不溶性膳食纤维摄入量	3	101,084	–	0.62 (0.38–1.03)
可溶性膳食纤维摄入量	3	80,888	10,851	0.89 (0.83–0.96)
总膳食纤维摄入量	7	972,077	64,899	0.92 (0.86–1.00)



暴露类别

类胡萝卜素 · 维生素 A、C、D、E、K · B 族维生素 · 多酚与黄酮类 · 水果与蔬菜 · 植物雌激素 · 脂肪酸与脂质 · 代谢物与氨基酸 · 草本与植物制品 · 其他 · 饮食模式

RR < 1 = 与前列腺癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No